

Keglesnit (conus)

Hvornår får man lavet et keglesnit?

Du har fået konstateret celleforandringer på livmoderhalsen. Det er vigtigt at understrege, at sådanne celleforandringer IKKE er kræft. Stort set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver fuldstændig helbredt.

Celleforandringerne opstår oftest i slimhinden i livmoderhalsen, men kan også opstå i de slimproducerende kirtelceller på indersiden af livmoderhalsen. Celleforandringer opdeles i lette, moderate og svære forandringer (kaldet dysplasi) eller carcinoma in situ. Forandringerne er påvist på baggrund af en celleprøve (smear), suppleret med en kikkertundersøgelse (kolposkopi), et skrab og vævsprøver fra livmoderhalsen, som er undersøgt ved mikroskopi. Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes en virus, der er seksuelt overført (HPV). Både virusinfektionen og celleforandringer er ofte symptomløse.


Forberedelse til dit indgreb

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse. Vi anbefaler, at du tager lidt smertestillende før du tager hjemmefra, for eksempel 1 g Panodil og 400 mg Ibuprofen.

Indgrebet

Indgrebet foregår gennem skeden, mens du ligger på et gynækologisk leje. Lægen lægger lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. De første par stik vil du kunne mærke. Herefter vil du ikke kunne føle smerte. Du vil hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen er bedøvet. Når bedøvelsen virker, udskares et lille kegleformet vævsstykke fra livmoderhalsen med en elektrisk slynge (loop). Dette tager mindre end 10 sekunder. Eventuel blødning stoppes umiddelbart herefter med brænding (koagulering) af sårfladen. Dette vil du heller ikke kunne mærke. Hele indgrebet

varer sædvanligvis cirka 20-30 minutter. Vævet bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse.



Efter indgrebet

Du bliver udskrevet cirka 1 time efter indgrebet. Vi sikrer, at du ikke bløder for meget fra livmoderhalsen forinden. Der kan være småblødninger eller brunligt, vandigt, eventuelt ildelugtende udflåd fra skeden i op til 2 uger efter operationen. Omkring 8-10 dage efter operationen kan der komme en ny blødning, når sårskorpen på livmoderhalsen løsnes og afstødes. Efter 3-6 uger er livmoderhalsen helet op, og ny slimhinde dækker området, hvorfra keglen er fjernet.

Der er ingen egentlig sygdommelding. For at give såret ro til at hele bør du dog undlade tunge løft og anden fysisk anstrengelse (f.eks. cykling, løb, anden sport og rengøring) i en uge efter indgrebet. Du bør ligeledes undgå samleje, karbad, svømning og brug af tamponer i 1 måned.

Komplikationer

Hvis der indenfor det første døgn opstår kraftig, frisk blødning, kraftige smerter eller temperaturforhøjelse, skal du kontakte vagtlægen. Der kan i enkelte tilfælde være behov for fornyet koagulering svarende til livmoderhalsen, hvis det bløder kraftigt. I så fald vil det foregå på hospitalet.

Keglesnit (conus)

Mikroskopisvar

Du vil indenfor 14 dage modtage en mail med mikroskopisvar. Her får du information om sværhedsgraden af dine celleforandringer og om, hvorvidt celleforandringerne er fjernet i sundt væv. Der vil blive planlagt en opfølgende celleprøve 6 måneder efter indgrebet.

Venlig hilsen
Personalet
Gynækologisk Klinik