

Keglesnit for celleforandringer på livmoderhalsen

Det er blevet besluttet, at du skal have foretaget et keglesnit. De fleste keglesnit bliver foretaget i lokalbedøvelse her på klinikken. Hvis du har behov for fuldbedøvelse, bliver du henvist til hospitalet. Denne pjeces fortæller lidt mere om, hvad et keglesnit indebærer.

Hvornår får man lavet et keglesnit?

Du har fået konstateret celleforandringer på livmoderhalsen. Det er vigtigt at understrege, at sådanne celleforandringer IKKE er kræft. Stort set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver fuldstændig helbredt.

Celleforandringerne opstår oftest i slimhinden i livmoderhalsen, men kan også opstå i de slimproducerende kirtelceller på indersiden af livmoderhalsen. Celleforandringer opdeles i lette, moderate og svære forandringer (kaldet dysplasi) eller carcinoma in situ.

Forandringerne er påvist på baggrund af en celleprøve (smear), suppleret med en kikkertundersøgelse (kolposkopi), et skrab og vævsprøver fra livmoderhalsen, som er undersøgt ved mikroskopi (KBC).

Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes en virus, der er seksuelt overført (HPV). Både virusinfektionen og celleforandringer er ofte symptomløse.


Før indgrebet

Vi anbefaler, at du smertestillende, før du tager hjemmefra, for eksempel 1 gram Panodil og 400 mg Ibuprofen.

Indgrebet

Indgrebet foregår gennem skeden, mens du ligger på et gynækologisk lege. Lægen lægger lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. De første par stik vil du kunne mærke. Herefter vil du ikke kunne føle

smerte. Du vil hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen er bedøvet.



Når bedøvelsen virker, udskæres et lille kegleformet vævsstykke fra livmoderhalsen med en elektrisk slynge (loop). Dette tager mindre end 10 sekunder.

Eventuel blødning stoppes umiddelbart efter med brænding (koagulering) af sårfladen. Dette vil du heller ikke kunne mærke.

Hele indgrebet varer sædvanligvis 10-15 minutter.

Vævet bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse. Her undersøges det, om forandringerne er fjernet helt. Der kan gå op til 6-8 uger før resultatet foreligger.

Efter indgrebet

For at være helt sikker på, at sårfladen er tør, skal du sidde cirka 20 minutter i venteværelset. Herefter kan du gå hjem. Der kan være småblødninger eller brunligt, vandigt, eventuelt ildelugtende udflåd fra skeden i op til 14 dage efter operationen. Efter en uge kan der komme en ny blødning, når sårskorpen på livmoderhalsen løsnes og afstødes. Efter 3-6 uger er livmoderhalsen helet op, og ny slimhinde dækker området, hvor keglen er fjernet.

Der er ingen egentlig sygdomsmelding. For at give såret ro til at hele bør du dog undlade tunge løft og anden fysisk anstrengelse i en uge efter indgrebet. Du bør ligeledes undgå samleje, karbad, svømning og brug af tamponer i en måned.

Hvis der indenfor det første døgn opstår kraftig, frisk blødning, kraftige smerter eller temperaturforhøjelse, skal du kontakte vagtlægen. Der kan i enkelte tilfælde være behov for fornyet koagulering svarende til livmoderhalsen, hvis det bløder kraftigt

Efterkontrol

Du vil indenfor 14 dage modtage en mail med mikroskopisvar. Her får du information om sværhedsgraden af dine celleforandringer og om, hvorvidt celleforandringerne er fjernet i sundt væv. Der vil blive planlagt en opfølgende kontrol 6 måneder efter indgrebet.

Med venlig hilsen

Gynækologisk Klinik

